

Anticorps anti-PCSK9: Repatha® & Praluent®



Pour qui ?

- Hypercholestérolémies/ dyslipidémies
- Prévention secondaire des maladies cardiovasculaires (CV) athéroscléreuse (ex : infarctus du myocarde)
Traitement de 3ème intention

Pour quoi ?

- Diminuer les taux de LDL-cholestérol

Quel taux ?

Différent pour chacun !

- Ldl-c < 1.16g/L : patients à faible risque CV
- LDL-c < 1 g/L : risque CV modéré
- LDL-c < 0.7 g/L : risque CV élevé
- **LDL-c < 0.55 g/L*** : très haut risque CV = prévention secondaire CV


*peut se voir abaisser à 0.4g/L si récurrence d'infarctus dans les 2 ans

POSOLOGIE


1 injection toutes les 2 ou 4 semaines.

MODE ADMINISTRATION

- 1) Sortir le stylo du réfrigérateur 30 minutes avant l'injection.
- 2) Vérifier la **conformité** du stylo.
- 3) Se laver les mains et **nettoyer** le site d'injection (cuisse ou abdomen).
- 4) Retirer le **capuchon** du stylo (rouge ou bleu).



- 5) Etirer la peau de la cuisse ou pincer celle de l'abdomen.
- 6) Placer le stylo avec un angle de **90°** contre la peau de manière à ce que l'embout jaune soit totalement enfoncé.



- 7) **Appuyer** sur le **bouton gris** avec le pouce (1er déclic) et maintenir le stylo contre la peau environ **15/20 secondes**.
- 8) 2ème déclic : l'injection est terminée (la chambre jaune du stylo est vide).



- 9) Mettre le stylo dans un DASRI.

DELIVRANCE



Ces médicaments sont soumis à une **Demande d'Accord Préalable** à l'assurance maladie pour être **remboursable** :

Prescription issue du téléservice mentionnant un accord de prise en charge par l'assurance maladie



OU



Volet 3 du formulaire de demande papier de la DAP + un accord de prise en charge issu du service médical de l'assurance maladie

OUBLI



- Oubli < **7 jours** : injecter la dose dès que possible sans décaler la prochaine prise.
- Oubli > **7 jours**, en fonction de la posologie :
 - Toutes les 2 semaines : sauter la prise et attendre la prochaine injection prévue.
 - Tous les mois : injecter la dose dès que possible ET décaler la prochaine prise.

EFFETS INDESIRABLES

Réactions au site d'injection, syndrome pseudo-grippaux, infections ORL, myalgies...



CONSERVATION

- Au frigo (2-8°C) : jusqu'à péremption
- En dehors du frigo (<25°C) : max 30 jours