

GUIDE À LA DISPENSATION DES MÉDICAMENTS DE L'AMP POUR L'ÉQUIPE OFFICINALE

CLASSE	DCI + SPÉCIALITÉS	PRÉSENTATIONS	CONDITIONNEMENT	CIP	MATERIEL À FOURNIR	CONSERVATION																
hMG (Activité FSH et LH)	Ménotropine MENOPUR®	75 UI/mL	5 flacons de poudre, à reconstituer + 5 ampoules de solvant	34009 3568161 4	5 seringues 1 ou 2 mL + 5 aiguilles pour la reconstitution : gauge 18 (rose) ACL : 6179299 (voire G21, injection IM (vert)) + 5 aiguilles pour l'injection : gauge 25, 26 et 30 (orange, marron, jaune) ACL : 6610633, 7004171, 6063131	Avant ouverture : T < 25°C Après reconstitution : immédiatement																
		600 UI/mL	1 flacon, à reconstituer + 1 seringue pré-remplie de solvant + 1 aiguille pour la reconstitution + 9 seringues prémontées (graduées de 37,5 à 600 UI)	34009 2739092 0	Ø	Avant ouverture : entre 2 et 8°C Après ouverture : max 28 jours, T < 25°C																
	Ménotropine FERTISTARTKIT® (Biosimilaire de Ménopur®)	75 UI/mL	5 flacons, à reconstituer + 5 seringues + 5 aiguilles pour la reconstitution + 5 aiguilles pour l'injection	34009 3002109 5	<table border="1"><tr><th colspan="2">FERTISTARTKIT 75 UI poudre et solvant pour solution injectable</th></tr><tr><th>Nombre de flacons utilisés</th><th>Quantité totale de ménotropine dans 1 ml de solution</th></tr><tr><td>1</td><td>75 UI</td></tr><tr><td>2</td><td>150 UI</td></tr><tr><td>3</td><td>225 UI</td></tr><tr><td>4</td><td>300 UI</td></tr><tr><td>5</td><td>375 UI</td></tr><tr><td>6</td><td>450 UI</td></tr></table>	FERTISTARTKIT 75 UI poudre et solvant pour solution injectable		Nombre de flacons utilisés	Quantité totale de ménotropine dans 1 ml de solution	1	75 UI	2	150 UI	3	225 UI	4	300 UI	5	375 UI	6	450 UI	Avant ouverture : T < 25°C Après reconstitution : immédiatement
		FERTISTARTKIT 75 UI poudre et solvant pour solution injectable																				
Nombre de flacons utilisés	Quantité totale de ménotropine dans 1 ml de solution																					
1	75 UI																					
2	150 UI																					
3	225 UI																					
4	300 UI																					
5	375 UI																					
6	450 UI																					
900 UI/2mL	1 flacon de poudre + 1 seringue pré-remplie de solvant + 1 aiguille pour la reconstitution + 12 seringues pré-montées (graduées de 37,5 à 450 UI)	34009 3026755 4	Ø	Avant ouverture : entre 2 et 8°C Après ouverture : max 28 jours, T < 25°C																		

CLASSE	DCI + SPÉCIALITÉS	PRÉSENTATIONS	CONDITIONNEMENT	CIP	MATERIEL À FOURNIR	CONSERVATION
FSH	Urofollitropine FOSTIMONKIT®	150 UI/mL	5 flacons de poudre + 5 seringues préremplies de solvant + 5 aiguilles pour la reconstitution + 5 aiguilles pour l'injection	34009 3760970 8	Ø	Avant ouverture : T < 25°C Après reconstitution : immédiatement
	Follitropine α BEMFOLA®	75 UI/mL	1 stylo prépli (gradué de 37,5 UI à 75 UI par pallier de 12,5 UI) + 1 aiguille	34009 2793909 9	Ø	Avant ouverture : entre 2 et 8°C ou max 3 mois, T < 25°C Après ouverture : immédiatement
		150 UI/mL	1 stylo prépli (gradué de 75 UI à 150 UI par pallier de 12,5 UI) + 1 aiguille	34009 2793915 0	Ø	Avant ouverture : entre 2 et 8°C ou max 3 mois, T < 25°C Après ouverture : immédiatement
		225 UI/mL	1 stylo prépli (gradué de 150 UI à 225 UI par pallier de 12,5 UI) + 1 aiguille	34009 2793921 1	Ø	Avant ouverture : entre 2 et 8°C ou max 3 mois, T < 25°C Après ouverture : immédiatement
		300 UI/mL	1 stylo prépli (gradué de 225 UI à 300 UI par pallier de 12,5 UI) + 1 aiguille	34009 2793938 9	Ø	Avant ouverture : entre 2 et 8°C ou max 3 mois, T < 25°C Après ouverture : immédiatement
		450 UI/mL	1 stylo prépli (gradué de 300 UI à 450 UI par pallier de 12,5 UI) + 1 aiguille	34009 2793944 0	Ø	Avant ouverture : entre 2 et 8°C ou max 3 mois, T < 25°C Après ouverture : immédiatement

CLASSE	DCI + SPÉCIALITÉS	PRÉSENTATIONS	CONDITIONNEMENT	CIP	MATERIEL À FOURNIR	CONSERVATION
FSH	Follitropine α GONAL-F® (Biosimilaire de Bemfola®)	1050 UI/mL	1 flacon de poudre + 1 seringue préremplie de solvant + 15 seringues (graduées en unité de FSH)	34009 3578018 8	Ø	Avant ouverture : T < 25°C Après ouverture : max 28 jours, T < 25°C
		150 UI/mL	1 stylo prépli (gradué par pallier de 12,5 UI) + 4 aiguilles	34009 3021265 3	Ø	Avant ouverture : T < 25°C durant 3 mois ou entre 2 et 8°C Après ouverture : max 28 jours, T < 25°C
		300 UI/mL	1 stylo prépli (gradué par pallier de 12,5 UI) + 8 aiguilles	34009 3634797 7	Ø	Avant ouverture : T < 25°C durant 3 mois ou entre 2 et 8°C Après ouverture : max 28 jours, T < 25°C
		450 UI/mL	1 stylo prépli (gradué par pallier de 12,5 UI) + 12 aiguilles	34009 3634805 9	Ø	Avant ouverture : T < 25°C durant 3 mois ou entre 2 et 8°C Après ouverture : max 28 jours, T < 25°C
		900 UI/mL	1 stylo prépli (gradué par pallier de 12,5 UI) + 16 aiguilles	34009 3634811 0	Ø	Avant ouverture : T < 25°C durant 3 mois ou entre 2 et 8°C Après ouverture : max 28 jours, T < 25°C
	Follitropine α OVALEAP® (Biosimilaire de Gonal-F® et Bemfola®)	300 UI/mL	Cartouche de solution injectable + 10 aiguilles	34009 2790302 1	Ø	Avant ouverture : entre 2 et 8°C ou max 3 mois, T < 25°C Après ouverture : max 28 jours, T < 25°C
		450 UI/mL	Cartouche de solution injectable + 10 aiguilles	34009 2790319 9	Ø	Avant ouverture : entre 2 et 8°C ou max 3 mois, T < 25°C Après ouverture : max 28 jours, T < 25°C

CLASSE	DCI + SPÉCIALITÉS	PRÉSENTATIONS	CONDITIONNEMENT	CIP	MATERIEL À FOURNIR	CONSERVATION
FSH	Follitropine α OVALEAP® (Biosimilaire de Gonal-F® et Bemfola®)	900 UI/ML	Cartouche de solution injectable + 20 aiguilles	34009 2790325 0	Ø	Avant ouverture : entre 2 et 8°C ou max 3 mois, T < 25°C Après ouverture : max 28 jours, T < 25°C
		OVALEAP PEN	Gradué en 12,5 UI / 12,5 UI	50606 3250891 1	Ø	Ø
	Follitropine β PUREGON®	300 UI/mL	Cartouche de solution injectable + 6 aiguilles	34009 3530974 7	Ø	Avant ouverture : entre 2 et 8°C ou max 3 mois, T < 25°C Après ouverture : max 28 jours, T < 25°C
		600 UI/mL	Cartouche de solution injectable + 6 aiguilles	34009 3530980 8	Ø	Avant ouverture : entre 2 et 8°C ou max 3 mois, T < 25°C Après ouverture : max 28 jours, T < 25°C
		900 UI/mL	Cartouche de solution injectable + 9 aiguilles	34009 3651413 3	Ø	Avant ouverture : entre 2 et 8°C ou max 3 mois, T < 25°C Après ouverture : max 28 jours, T < 25°C
		PUREGON PEN	Gradué en 12,5 UI / 12,5 UI	34010 7576370 3	Ø	Ø
	Corifollitropine α ELONVA®	100 µg	Seringue préremplie	34009 3745901 3	Ø	Avant ouverture : entre 2 et 8°C ou Après ouverture : max 28 jours, T < 25°C
		150 µg	Seringue préremplie	34009 3745918 1	Ø	Avant ouverture : entre 2 et 8°C ou Après ouverture : max 28 jours, T < 25°C

CLASSE	DCI + SPÉCIALITÉS	PRÉSENTATIONS	CONDITIONNEMENT	CIP	MATERIEL À FOURNIR	CONSERVATION
FSH	Follitropine δ REKOVELLE®	12 μ g/0,36mL	Stylo prérempli + 3 aiguilles Vérifier la dose prescrite avec la patiente : le stylo délivre des doses de 0,33 μ g à 20 μ g par intervalles gradués de 0,33 μ g	34009 3011098 0	Ø	Avant ouverture : entre 2 et 8°C ou 3 mois à T < 25°C Après ouverture : max 28 jours, T < 25°C
		36 μ g/1,08mL	Stylo prérempli + 9 aiguilles Vérifier la dose prescrite avec la patiente : le stylo délivre des doses de 0,33 μ g à 20 μ g par intervalles gradués de 0,33 μ g	34009 3011099 7	Ø	Avant ouverture : entre 2 et 8°C ou 3 mois à T < 25°C Après ouverture : max 28 jours, T < 25°C
		72 μ g/2,16mL	Stylo prérempli + 15 aiguilles Vérifier la dose prescrite avec la patiente : le stylo délivre des doses de 0,33 μ g à 20 μ g par intervalles gradués de 0,33 μ g	34009 3011100 0	Ø	Avant ouverture : entre 2 et 8°C ou 3 mois à T < 25°C Après ouverture : max 28 jours, T < 25°C
FSH + LH	Follitropine α et Lutropine α PERGOVERIS®	300 UI + 150 UI	Stylo prérempli + 5 aiguilles (Délivre 2 doses de 150 UI / 75 UI)	34009 3008921 7	Ø	Avant ouverture : entre 2 et 8°C ou Après ouverture : max 28 jours, T < 25°C
		450 UI + 225 UI	Stylo prérempli + 7 aiguilles (Délivre 3 doses de 150 UI / 75 UI)	34009 3008922 4	Ø	Avant ouverture : entre 2 et 8°C ou Après ouverture : max 28 jours, T < 25°C
		900 UI + 450 UI	Stylo prérempli + 14 aiguilles (Délivre 6 doses de 150 UI / 75 UI)	34009 3008923 1	Ø	Avant ouverture : entre 2 et 8°C ou Après ouverture : max 28 jours, T < 25°C

CLASSE	DCI + SPÉCIALITÉS	PRÉSENTATIONS	CONDITIONNEMENT	CIP	MATERIEL À FOURNIR	CONSERVATION
LH	Lutropine α LUVERIS®	75 UI/mL	1 flacon de poudre + 1 flacon de solvant	34009 3549643 0	1 seringue 1 ou 2 mL + 1 aiguille pour la reconstitution : gauge 18 (rose) ACL : 6179299 (voire G21, injection IM (vert)) + 1 aiguille pour l'injection : gauge 25, 26 et 30 (orange, marron, jaune)	Avant ouverture : T < 25°C Après ouverture : immédiatement
		75 UI/mL	3 flacons de poudre + 3 flacons de solvant	34009 3549666 9	3 seringues 1 ou 2 mL + 3 aiguilles pour la reconstitution : gauge 18 (rose) ACL : 6179299 (voire G21, injection IM (vert)) + 3 aiguilles pour l'injection : gauge 25, 26 et 30 (orange, marron, jaune)	Avant ouverture : T < 25°C Après ouverture : immédiatement
hCG	Choriogonadotropine α OVITRELLE®	250 µg STYLO	Cartouche en stylo prérempli + 1 aiguille	34009 2170947 6	Ø	Avant ouverture : entre 2 et 8°C Après ouverture : immédiatement
Agonistes GnRH	Triptoréline DÉCAPEPTYL®	0,1 mg (SC)	7 flacons + 7 ampoules de solvant - Si poso : 2 ampoules = reconstituer le premier flacon de poudre avec un solvant et introduire le mélange dans le 2e flacon - Si poso : 1/2 ampoule = reconstituer la totalité d'un flacon puis en aspirer la moitié	34009 3285026 6	7 seringues 1 ou 2 mL + 7 aiguilles pour la reconstitution : gauge 18 (rose) ACL : 6179299 (voire G21, injection IM (vert)) + 7 aiguilles pour l'injection : gauge 25, 26 et 30 (orange, marron, jaune) ACL : 6610633, 7004171, 6063131	Avant ouverture : T < 25°C Après ouverture : immédiatement

CLASSE	DCI + SPÉCIALITÉS	PRÉSENTATIONS	CONDITIONNEMENT	CIP	MATERIEL À FOURNIR	CONSERVATION
Agonistes GnRH	Triptoréline DÉCAPEPTYL®	LP 3 mg (IM)	1 Flacon de poudre + 1 ampoule de solvant + 1 seringue + 1 aiguille pour la reconstitution + 1 aiguille pour l'injection IM	34009 3394376 9	Ø	Avant ouverture : T < 25°C Après ouverture : immédiatement
	Nafaréline SYNAREL®	0,2 mg / dose	Solution pour pulvérisation nasale (60 doses)	34009 3535210 1	Ø	T < 25°C
	Gonadoreline LUTRELF®	3,2 mg	1 flacon de poudre + 1 flacon de solvant	34009 3284363 3	Auto-injecteur (délivré dans les centres d'AMP)	Avant reconstitution : T < 25°C Après reconstitution : Max 3 jours
Antagonistes GnRH	Cétrorélix CÉTROTIDE®	0,25 mg/mL	1 flacon de poudre + 1 aiguille pour la reconstitution + 1 aiguille pour l'injection	34009 3517790 2	Ø	Avant ouverture : T < 25°C Après ouverture : immédiatement
	Ganirélix ORGALUTRAN®	0,25 mg/0,5mL	1 seringue préremplie + 1 aiguille pour l'injection	34009 3553018 9	Ø	T < 25°C
		0,25 mg/0,5mL	5 seringues préremplies + 5 aiguilles pour l'injection	34009 3553024 0	Ø	T < 25°C
	Ganirélix FYREMADEL®	0,25 mg/0,5mL	1 seringue préremplie + 1 aiguille pour l'injection	34009 2751710 5	Ø	T < 25°C
	(Biosimilaire de Orgalutran®)	0,25 mg/0,5mL	5 seringues préremplies + 5 aiguilles pour l'injection	34009 2751704 4	Ø	T < 25°C